

## DOS 20 ANOS AOS 60+

### CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 2024-2025

A recomendação de vacinas para adultos e idosos deve ser individualizada, de acordo com o histórico pessoal e vacinas recebidas anteriormente.

- Rotina
- Recomendada em situações que justifiquem: presença de comorbidades, risco epidemiológico, entre outros
- Contraindicada

Vacinas	20 a 45 anos	46 a 49 anos	50 a 59 anos	60+ anos	Gestantes
SCR	DUAS DOSES: 0 - 1 MÊS			●	●
Hepatite A	DUAS DOSES: 0 - 6 MESES			●	●
Hepatite B	TRÊS DOSES: 0 - 1 - 6 MESES				SE NÃO VACINADA
HPV4 ou HPV9	TRÊS DOSES: 0 - 1 A 2 - 6 MESES	USO FORA DE BULA A CRITÉRIO MÉDICO			●
dTpa	UMA DOSE A CADA DEZ ANOS				A CADA GESTAÇÃO
dT	UMA OU DUAS DOSES DE dT APÓS A DOSE DE dTpa PARA OS NÃO ADEQUADAMENTE VACINADOS PARA O TÉTANO				
Varicela	PARA SUSCETÍVEIS: DUAS DOSES: 0 - 1 MÊS			●	●
Influenza (gripe – Tri, Tetravalente e HD4V*)	UMA DOSE ANUAL				
Meningocócicas conjugadas (ACWY ou C)**		●		●	●
Meningocócica B	●		USO FORA DE BULA A CRITÉRIO MÉDICO		
Febre amarela	DUAS DOSES				●
VPC13 ou VPC15		●		UMA DOSE	●
VPP23		●		DUAS DOSES: SEIS MESES APÓS VPC13 OU VPC15 E CINCO ANOS APÓS A PRIMEIRA VPP23	●
Herpes-zóster (VZR)***	●		DUAS DOSES: 0 - 2 MESES		●
Dengue****		●		USO FORA DE BULA A CRITÉRIO MÉDICO	●
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em <a href="http://gov.br/saude/pt-br/assuntos/coronavirus">gov.br/saude/pt-br/assuntos/coronavirus</a>				
VSR*****		●		UMA DOSE	●

18/03/2024 • Este calendário não substitui a recomendação médica. Converse com seu médico sobre vacinação. Para mais informações consulte os *Calendários de vacinação SBIm* – [sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao](http://sbim.org.br/calendarios-de-vacinacao).

\* Preferencial para 60 anos ou mais.

\*\* Preferir a menACWY.

\*\*\* A vacina inativada (VZR) é recomendada para pacientes que já tiveram a doença e para vacinados previamente com a vacina atenuada (VZA), respeitando um intervalo mínimo de dois meses entre elas.

\*\*\*\* Qdenga® é a vacina preferencial, recomendada até os 60 anos de idade independente de contato prévio com o vírus da dengue. Dengvaxia® é recomendada até os 45 anos de idade, somente para soropositivos para dengue.

\*\*\*\*\* Arexvy® uma dose, a qualquer momento, independente da sazonalidade.

SCR	Sarampo, caxumba e rubéola
dT	Dupla do tipo adulto (difteria e tétano)
dTpa	Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (difteria, tétano e coqueluche)
VPC13 ou VPC15	Vacinas pneumocócicas conjugadas 13-valente e 15-valente
VPP23	Vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente
HPV4 e HPV9	Vacinas papilomavirus humano 4-valente e 9-valente
VSR	Vírus Sincicial Respiratório