

CALENDÁRIO VACINAL SBIIm 2024/2025

Do nascimento à terceira idade



VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 10 ANOS DE IDADE																		ADOLESCENTE		ADULTO		IDOSO	DISPONIBILIDADE DAS VACINAS												
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	10 a 19 anos	20 a 49 anos	50 a 59 anos	A partir de 60 anos	GRATUITAS NA REDE PÚBLICA	CLÍNICAS PRIVADAS	NOS CRIE*											
BCG ID	1 Dose	Vacinar os não vacinados anteriormente												Vacinar pessoas contactantes de hanseníase										SIM	SIM	NÃO										
Hepatite B	Três ou quatro doses a partir do nascimento												Vacinar os não vacinados anteriormente										SIM	SIM	SIM											
Rotavírus	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada (VR1 ou VR5). Iniciar vacinação antes das 15 semanas de vida.								CONTRAINDICADA																		SIM	SIM	NÃO							
Tríplice bacteriana (DTPw, DTPa ou dTpa)	Três doses (DTPa ou DTPw) iniciando aos 2 meses de idade												REFORÇO	Reforço com DTPa, DTPw ou dTpa		Reforço com dTpa a partir dos 9 anos de idade e a cada dez anos (ou, na impossibilidade de dTpa, usar dT)										SIM, DTPw e dT; dTpa para gestantes e profissionais da saúde	SIM, DTPa e dTpa	SIM, DTPa								
Haemophilus influenzae b	Três doses iniciando aos 2 meses de idade												REFORÇO	Vacinar os não vacinados anteriormente		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, três primeiras doses	SIM	SIM								
Poliomielite (vírus inativados)	Três doses iniciando aos 2 meses de idade												REFORÇO	REFORÇO		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, três primeiras doses	SIM	SIM								
Pneumocóccas conjugadas	Duas ou três doses dependendo da vacina utilizada VPC10, VPC13 ou VPC15, iniciando aos 2 meses de idade												REFORÇO	VPC10, VPC13 ou VPC15 – Vacinar os não vacinados anteriormente		VPC13 ou VPC15: vacinar pessoas em situações especiais de risco					VPC13 ou VPC15: uma dose					SIM, VPC10, menores de 5 anos	SIM	SIM, VPC10 e VPC13								
Meningocócica conjugada ACWY ou C	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade												REFORÇO	REFORÇO		Para não vacinados até 15 anos, duas doses com intervalo de cinco anos. A partir de 16 anos, uma dose.		Vacinar pessoas em situações especiais de risco										SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 a 14 anos	SIM	SIM, menC e menACWY						
Meningocócica B	Duas doses iniciando aos 3 meses de idade												REFORÇO	Para os não vacinados anteriormente – Duas ou três doses de acordo com a faixa etária e a vacina utilizada										Vacinar pessoas em situações especiais de risco										NÃO	SIM	NÃO
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados)	CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO																		SIM	NÃO	NÃO															
Influenza (gripe)	VACINAÇÃO ANUAL																		SIM, Trivalente menores de 5 anos e maiores de 60 anos	SIM, Tri ou Tetravalente e HD4V (60 anos ou +)	SIM, Trivalente															
Febre amarela	Duas doses: aos 9 meses de vida e aos 4 anos de idade. / Recomendação do PNI: se recebeu a primeira dose antes dos 5 anos, indicada uma segunda dose, independentemente da idade atual. Se aplicada a partir dos 5 anos: dose única. / Recomendação da SBIIm: Duas doses. Como há possibilidade de falha vacinal mesmo para quem receber a primeira dose a partir dos 5 anos, a SBIIm recomenda uma segunda dose dez anos após. / Essa vacina pode ser exigida para emissão do CIVP, atendendo exigências sanitárias de alguns destinos internacionais. Neste caso, deve ser aplicada até dez dias antes de viajar.																		SIM	SIM	NÃO															
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)	Duas doses a partir dos 12 meses												Vacinar os não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, até 59 anos	SIM	NÃO						
Varicela (catapora)	Duas doses a partir dos 12 meses												Vacinar os suscetíveis não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM	SIM	SIM						
Hepatite A	Duas doses a partir dos 12 meses												Vacinar os não vacinados anteriormente										Vacinar pessoas em situações especiais de risco					SIM, uma dose para menores de 5 anos	SIM	SIM						
HPV**	Duas doses com intervalo mínimo de seis meses entre elas.																		Vacinar adultos até 45 anos com três doses (0-1 a 2-6 meses).		A critério médico, vacinar pessoas em situações especiais de risco, três doses (0-1 a 2-6 meses).										SIM, HPV4 uma dose para meninas e meninos de 9 a 14 anos.	SIM, HPV9	SIM, HPV4 três doses para homens e mulheres até 45 anos pertencentes a grupos especiais			
Pneumocócica 23 valente	Vacinar pessoas em situações especiais de risco																		Duas doses com intervalo de cinco anos					NÃO	SIM	SIM										
Herpes zóster	Duas doses, dois meses de intervalo. A partir dos 18 anos, vacinar pessoas em situações especiais de risco																		Duas doses, dois meses de intervalo. Rotina a partir dos 50 anos					NÃO	SIM	NÃO										
Dengue	Qdenga® é a vacina preferencial, recomendada entre 4 e 60 anos, independente de contato prévio com o vírus da dengue – duas doses com intervalo de três meses entre elas. Dengvaxia® é recomendada entre 6 e 45 anos, somente para soropositivos para dengue – três doses com intervalo de seis meses entre elas.																		NÃO	SIM	NÃO															
Covid-19	Acesse os dados atualizados sobre a disponibilidade de vacinas e os grupos contemplados pelo PNI em gov.br/saude/pt-br/assuntos/coronavirus																																			
VSR	Nirsevimab – Dose única universal para ≤ 1 ano na primeira sazonalidade.												Arexvy®: Uma dose, a qualquer momento, independente da sazonalidade.										NÃO	SIM	NÃO											

27/03/2024 • Orientações, esquemas de doses e comentários devem ser consultados nos *Calendários de vacinação SBIIm 2024/2025* e nos *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.

** Esquemas para menores de 20 anos. PNI: HPV4 uma dose dos 9-14 anos. SBIIm: HPV9 duas doses dos 9-19 anos e três doses de 20 anos em diante.

* Consultar manual do CRIE em <https://sbim.org.br/images/calendarios/manual-dos-centros-de-referencia-para-imunobiologicos-especiais-6a-edicao-2023.pdf> (acesso em 27.03.2024). Para pacientes com determinadas doenças crônicas e sob orientação médica, consultar os *Calendários de vacinação SBIIm pacientes especiais*.



Manual do CRIE



Calendários de vacinação SBIIm



Rotina



Vacinar não vacinados



Situações especiais



Contraídicada